

## 14. Heveny rosszullétek, koponyaalapi törés

Szerző dezs

Elsősegély tételek

14.a)  
Elsősegélynyújtás heveny  
rosszullétek esetén  
b)

A  
koponyaalapi törés tünetei,  
ellátása

Ájulás

.  
heveny  
perifériás keringési  
elégtelenség  
.  
átmenetileg, hirtelen  
csökken a vérnyomás és az agy  
vérellátása zavart szenved

.  
oka lehet kellemetlen  
látvány, tartós  
állás, rossz szag, izgalom

.  
foltokat vél  
látni a  
beteg,melegérzete van, majd összeesik

.  
önmagától  
rendeződő folyamat

.  
beteget lefektetjük,  
lábát  
felemeljük (Trendelenburg helyzet)

Epilepszia

.  
a központi idegrendszer  
körülírt területén,  
fejlődési rendellenesség miatt  
kialakuló elváltozás amely  
időszakosan jelentkező tónusos görcsökben,  
rohamokban nyilvánul meg

.  
a kis roham alkalmával  
csak  
rövid ideig tartó  
eszméletlenség alakul ki

.  
a nagy roham során a  
beteg  
eszméletét veszti,  
elvágódik majd a teljes vázizomzatban  
fél percig tartó

merevgörcsöt átmenet  
nélkül rángógörcs  
váltja fel.

-  
a tüdőkből  
kipréselt levegő  
sikoly szerű hangot okoz

-  
beteg arca szederjes

-  
vizeletét,  
székletét maga  
alá üríti

Elsősegély :  
biztonságos  
helyre vinni, lefogni nem szabad !! Nyelvét óvni  
a sérülésektől.

Koponyaalapi  
törés :

-  
elülső árok  
törése - szem  
körüli vérömleny,  
orrból csorgó vér és liquor  
keveréke

-  
középső  
árok törése - fül  
mögötti vérömleny és a  
fülből szivárgó véres- vizes  
folyadék

-  
hátsó  
árok törése -  
vérömleny a tarkón és  
véres- vizes folyadék csurog a garatfalon  
eszméletlen - stabil  
oldalfekvés, sebellátás  
eszméleténél  
van - sebellátás, hanyatt fektetjük  
vagy arra az oldalra ahonnan a vér folyik a  
füléből, vállát  
megemeljük