

14. Heveny rosszullétek, koponyaalapi törés

Szerző dezs

Elsősegély tételek

14.a)
Elsősegélynyújtás heveny
rosszullétek esetén
b)

A
koponyaalapi törés tünetei,
ellátása

Ájulás

.
heveny
perifériás keringési
elégtelenség
.
átmenetileg, hirtelen
csökken a vérnyomás és az agy
vérellátása zavart szenved

.
oka lehet kellemetlen
látvány, tartós
állás, rossz szag, izgalom

.
foltokat vél
láttni a
beteg,melegérzete van, majd összeesik

.
önmagától
rendeződő folyamat

.
beteget lefektetjük,
lábát
felemeljük (Trendelenburg helyzet)

Epilepszia

.
a központi idegrendszer
körülírt területén,
fejlődési rendellenesség miatt
kialakuló elváltozás amely
időszakosan jelentkező tónusos görcsökben,
rohamokban nyilvánul meg

.
a kis roham alkalmával
csak
rövid ideig tartó
eszméletlenség alakul ki

.
a nagy roham során a
beteg
eszméletét veszti,
elvágódik majd a teljes vázizomzatban
fél percig tartó

merevgörcsöt átmenet
nélkül rángógörcs
váltja fel.

-
a tüdőkből
kipréselt levegő
sikoly szerű hangot okoz

-
beteg arca szederjes

-
vizeletét,
székletét maga
alá üríti
Elsősegély :
biztonságos
helyre vinni, lefogni nem szabad !! Nyelvét óvni
a sérülésektől.

Koponyaalapi
törés :

-
elülső árok
törése - szem
körüli vérömleny,
orrból csorgó vér és liquor
keveréke

-
középső
árok törése - fül
mögötti vérömleny és a
fülből szivárgó véres- vizes
folyadék

-
hátsó
árok törése -
vérömleny a tarkón és
véres- vizes folyadék csurog a garatfalon
eszméletlen - stabil
oldalfekvés, sebellátás
eszméleténél
van - sebellátás, hanyatt fektetjük
vagy arra az oldalra ahonnan a vér folyik a
füléből, vállát
megemeljük