

12. Artériás nyomópontok, életjelenségek

Szerző dezs

Elsősegély tételek

12.a) Sorolja fel az artériás nyomópontokat
b)

Az életjelenségek vizsgálata

Artériás nyomópontok :

1. halántéki ütőér (a. temporalis superficialis) - külső hallónyílás előtt fölött
2. állcsonti ütőér (a. maxillaris externa) - az angulus mandibulae előtt két centiméterrel
3. közös nyaki ütőér (a. carotis communis) - gégeporc magasságában a gerincoszlophoz kell nyomni (végszükségben a sebbe belenyúlva ujjal összeszorítható)
4. kulcscsont alatti verőér (a. subclavia) - felülről hüvelykujjal az első bordához nyomjuk
5. felkari verőér (a. brachialis) - felkarcsont belső felszínéhez nyomjuk
6. combütőér (a. femoralis) - a lágyékhajlat alatt a combcsonthoz nyomjuk

Légzés

:

A kitáguló és visszasüllyedő mellkas mozgása jól látható, amikor a beteg lemeztelenített mellkasát oldalról annak szintjében figyeljük. Nem lélegzik a beteg ill. légzése a szervezet oxigén ellátását nem biztosítja, ha fél perc alatt nem észlelhető légzőmozgás.
Normális 14-16/perc
Keringés

:

Szívösszehúzódkor
a szív kamrái kb.70 ml vért
nyomnak az aortába, ill. a tüdőverőérbe.
A kamrák kitágulásakor az
ütőerek
rugalmas fala összehúzódva
továbbítja a vért, ez a
lökötető, pulzáló mozgás
jól
tapintható az artériákon. Art. carotis
communis.
Másodlagos
tünetek :
bőrszín lehet
sápadt (kivérzés) ill. szederjes
(sokk)
pupillák lehetnek
tágak (keringés leállása
után
60.90 másodperc múlva), szűkek
(morfinmérgezés)