

9. Égés, gerinctörött

Szerző dezs

Elsősegély tételek

9.a) Az égés
típusai, ellátása
b)

Gerinctörött
sérült vizsgálata,
ellátása

Az égést
okozhatja a testfelülettel érintkező
forró
gőz, víz vagy egyéb magas hőfokú
folyékony anyag, láng, izzó
fém.

Az
égés
fokozatai :
Első fokú -
bőrpír jellemzi, az égett bőrfelület
fájdalmas
Másodfokú -
égési hólyagok (bulla) alakulnak ki
Harmadfokú - a bőr felső
rétege teljesen elpusztul,
égési seb keletkezik

A
kilences
szabály :
fej
9%
mellkas és hasfal elől
2*9%
hát hátul
2*9%
két felső
végtag
2*9%
két alsó
végtag

2*2*9%

gáttájék

1%

$$11*9\% + 1\% = 100\%$$

Következményei

:

Az erek fala károsodik,
 plazma áramlik a szövetek
közé - vértérfogat
csökken - shock!!!

Égett felület
fertőzése !!!

Elsősegély

:

Az

égést

követő húsz percen belül az

égett testrész hűtése hideg

folyóvízzel, 10-15

percig !

Steril

fedőkötés. 3-5 %-ot meghaladó

égésnél kórházi

ápolás szükséges.

Gerinctörés

: Ha

tálcafogással

végigsimítjuk a beteg gerincét

duzzanatot ill. szintbeli eltérést

észlelünk. A

baleset mechanizmusából is

következtethetünk gerinctörésre.

A talált helyzetben

hagyjuk, nem szállítjuk!!! Mentők -

vákummatrac - azonnal kórház! Ha

mégis

mozdítani kell, akkor három

elsősegélynyújtó

tálcafogással egyszerre emelheti.