

## 9. Égés, gerinctörött

Szerző dezs

Elsősegély tételek

9.a) Az égés  
típusai, ellátása  
b)

Gerinctörött  
sérült vizsgálata,  
ellátása

Az égést  
okozhatja a testfelülettel érintkező  
forró  
gőz, víz vagy egyéb magas hőfokú  
folyékony anyag, láng, izzó  
fém.

Az  
égés  
fokozatai :  
Első fokú -  
bőrpír jellemzi, az égett bőrfelület  
fájdalmas  
Másodfokú -  
égési hólyagok (bulla) alakulnak ki  
Harmadfokú - a bőr felső  
rétege teljesen elpusztul,  
égési seb keletkezik

A  
kilences  
szabály :  
fej  
9%  
mellkas és hasfal elől  
2\*9%  
hát hátul  
2\*9%  
két felső  
végtag  
2\*9%  
két alsó  
végtag

2\*2\*9%

gáttájék

1%

$$11*9\% + 1\% = 100\%$$

Következményei

:

Az erek fala károsodik,  
 plazma áramlik a szövetek  
közé - vértérfogat  
csökken - shock!!!

Égett felület  
fertőzése !!!

Elsősegély

:

Az

égést

követő húsz percen belül az

égett testrész hűtése hideg

folyóvízzel, 10-15

percig !

Steril

fedőkötés. 3-5 %-ot meghaladó

égésnél kórházi

ápolás szükséges.

Gerinctörés

: Ha

tálcafogással

végigsimítjuk a beteg gerincét

duzzanatot ill. szintbeli eltérést

észlelünk. A

baleset mechanizmusából is

következtethetünk gerinctörésre.

A talált helyzetben

hagyjuk, nem szállítjuk!!! Mentők -

vákummatrac - azonnal kórház! Ha

mégis

mozdítani kell, akkor három

elsősegélynyújtó

tálcafogással egyszerre emelheti.