

8. Mentőhívás, eszméletlen beteg

Szerző dezs

Elsősegély tételek

8.a)
Mentőhívás
b)

Az
eszméletlen beteg ellátása

A mentők
hívószáma 104!!!
Mentő
hívásakor az alábbi adatokat kell
bemondani :

1.
Mi történt ?

.
karambol,
gázolás,
öngyilkosság, klinikai halál,
újraélesztés zajlik stb.

2.
Hol történt ?

.
városban :
kerület,
kereszteződés, házszám amely előtt az
esemény történt

.
lakásban :
kerület, utca,
házszám, lépcsőház
száma, emelet, ajtószám,
lakástulajdonos neve

.
üzemben : üzem
neve, címe,
kapu száma, épület száma

.
országúton :
út száma, km
szelvény

.
autópályán
: útszakasz
iránya, km szelvény

.
számozatlan
úton : két
község amely között a baleset
történt, km szelvény amely
után a számozatlan út
leágazik a számozott útról

.
nehezen
megközelíthető
helyszín : találkozási pont ahol egy
személy várja a mentőt

3.

Mennyi sérült
van és milyen
az állapotuk ?

.

könnyű, súlyos,
életveszélyes, halott

4.

Milyen egyéb
segítségre van
szükség ?

.

műszaki mentés,
rendőrség

Eszméletlenség

Eszméleten az agy
folyamatos
aktív működése által
fenntartott éber állapotot
értjük. Az eszmélet
fiziológiás
és mérsékelt fokú
felfüggesztése az alvás. Erősebb inger a
természetes alvást
azonnal megszünteti, a betegség miatt
bekövetkező eszméletlenség
állapotából
azonban a beteg nem vagy alig ébreszthető.
Vizsgálata

: a

legbiztosabb reflex a pillareflex !

.

légzés
és keringés vizsgálata

.

száj- garat
üreg
megtekintése, vér,
véralvadék, nyák,
hányadék, ételmaradék ill.
idegen test
eltávolítása

.

mozgatható műfogsor
eltávolítása

.

külsérelmi
nyomok vizsgálata
(koponyasérülés,
gerincsérülés)

.

stabil oldalfekvő helyzet
biztosítása

.

megfigyelés

A

stabil
oldalfekvés célja az
aspiráció kivédése, a
szabad légút biztosítása!
Tilos
stabil

oldalfekvést alkalmazni
gerinctörésnél,
medencetörésnél, nyílt hasi
sérülésnél,
combcsonttörés,
felkarcsonttörés, sorozat
bordatörés és
szegycsonttörés esetén!

A beteg bal oldalához
térdelünk, bal karunkkal a
beteg térdei alá nyulunk és
felhúzzuk. A térdet megdöntve a beteg
jobb karját
a jobb kezünkkel a beteg csípője alá
helyezzük. A beteg bal karját a
mellkasán
keresztbe helyezzük, majd felkarját a
válla alatt megragadva és térdeit
fogva
erőteljes mozdulattal a jobb oldalára fordítjuk.
Az oldalára fordított beteg
végtagjait elrendezzük úgy, hogy az alul
levő alsó végtagot behajlítjuk,
felül
levő alsó végtagot
kiegyenesítjük és a jobb
kézfejét a feje alá helyezzük.