

## 8. Mentőhívás, eszméletlen beteg

Szerző dezs

Elsősegély tételek

8.a)  
Mentőhívás  
b)

Az  
eszméletlen beteg ellátása

A mentők  
hívószáma 104!!!  
Mentő  
hívásakor az alábbi adatokat kell  
bemondani :

1.  
Mi történt ?

.  
karambol,  
gázolás,  
öngyilkosság, klinikai halál,  
újraélesztés zajlik stb.

2.  
Hol történt ?

.  
városban :  
kerület,  
kereszteződés, házszám amely előtt az  
esemény történt

.  
lakásban :  
kerület, utca,  
házszám, lépcsőház  
száma, emelet, ajtószám,  
lakástulajdonos neve

.  
üzemben : üzem  
neve, címe,  
kapu száma, épület száma

.  
országúton :  
út száma, km  
szelvény

.  
autópályán  
: útszakasz  
iránya, km szelvény

.  
számozatlan  
úton : két  
község amely között a baleset  
történt, km szelvény amely  
után a számozatlan út  
leágazik a számozott útról

.  
nehezen  
megközelíthető  
helyszín : találkozási pont ahol egy  
személy várja a mentőt

3.

Mennyi sérült  
van és milyen  
az állapotuk ?

.

könnyű, súlyos,  
életveszélyes, halott

4.

Milyen egyéb  
segítségre van  
szükség ?

.

műszaki mentés,  
rendőrség

Eszméletlenség

Eszméleten az agy  
folyamatos  
aktív működése által  
fenntartott éber állapotot  
értjük. Az eszmélet  
fiziológiás  
és mérsékelt fokú  
felfüggesztése az alvás. Erősebb inger a  
természetes alvást  
azonnal megszünteti, a betegség miatt  
bekövetkező eszméletlenség  
állapotából  
azonban a beteg nem vagy alig ébreszthető.  
Vizsgálata

: a

legbiztosabb reflex a pillareflex !

.

légzés  
és keringés vizsgálata

.

száj- garat  
üreg  
megtekintése, vér,  
véralvadék, nyák,  
hányadék, ételmaradék ill.  
idegen test  
eltávolítása

.

mozgatható műfogsor  
eltávolítása

.

külsérelmi  
nyomok vizsgálata  
(koponyasérülés,  
gerincsérülés)

.

stabil oldalfekvő helyzet  
biztosítása

.

megfigyelés

A

stabil  
oldalfekvés célja az  
aspiráció kivédése, a  
szabad légút biztosítása!  
Tilos  
stabil

oldalfekvést alkalmazni  
gerinctörésnél,  
medencetörésnél, nyílt hasi  
sérülésnél,  
combcsonttörés,  
felkarcsonttörés, sorozat  
bordatörés és  
szegycsonttörés esetén!

A beteg bal oldalához  
térdelünk, bal karunkkal a  
beteg térdei alá nyulunk és  
felhúzzuk. A térdet megdöntve a beteg  
jobb karját  
a jobb kezünkkel a beteg csípője alá  
helyezzük. A beteg bal karját a  
mellkasán  
keresztbe helyezzük, majd felkarját a  
válla alatt megragadva és térdeit  
fogva  
erőteljes mozdulattal a jobb oldalára fordítjuk.  
Az oldalára fordított beteg  
végtagjait elrendezzük úgy, hogy az alul  
levő alsó végtagot behajlítjuk,  
felül  
levő alsó végtagot  
kiegyenesítjük és a jobb  
kézfejét a feje alá helyezzük.