

3. Életjelenségek, eszméletlen beteg

Szerző dezs

Elsősegély tételek

3.a) Az életjelenségek vizsgálata
b)

Eszméletlen beteg vizsgálata, légútbiztosítás

a)
Légzés
:
A kitáguló és visszasüllyedő mellkas mozgása jól látható, amikor a beteg lemeztelenített mellkasát oldalról annak szintjében figyeljük. Nem lélegzik a beteg ill. légzése a szervezet oxigén ellátását nem biztosítja, ha fél perc alatt nem észlelhető légzőmozgás. Normális 14-16/perc
Keringés

:
Szívösszehúzódkor a szív kamrái kb.70 ml vért nyomnak az aortába, ill. a tüdőverőérbe. A kamrák kitágulásakor az ütőerek rugalmas fala összehúzódva továbbítja a vért, ez a lüktető, pulzáló mozgás jól tapintható az artériákon. Art. carotis communis.
Másodlagos tünetek :
bőrszín lehet sápadt (kivérzés) ill. szederjes (sokk)
pupillák lehetnek tágak (keringés leállása után
60.90 másodperc múlva), szűkek (morfinmérgezés)

b)
Eszméletlenség

Eszméletlen az agy folyamatos aktív működése által fenntartott éber állapotot értjük. Az eszmélet fizioiogiás és

mérsékelt fokú
felfüggesztése az alvás. Erősebb inger a
természetes alvást azonnal
megszünteti, a betegség miatt bekövetkező
eszméletlenség
állapotából azonban a
beteg nem vagy alig ébreszthető.

Vizsgálata

: a
legbiztosabb reflex a
pillareflex !

.

légzés
és keringés
vizsgálata

.

száj- garat
üreg
megtekintése, vér,
véralvadék, nyák,
hányadék, ételmaradék ill.
idegen test
eltávolítása

.

mozgatható műfogsor
eltávolítása

.

külsérelmi
nyomok vizsgálata
(koponyasérülés,
gerincsérülés)

.

stabil oldalfekvő helyzet
biztosítása

.

megfigyelés