

3. Életjelenségek, eszméletlen beteg

Szerző dezs

Elsősegély tételek

3.a) Az
életjelenségek vizsgálata
b)

Eszméletlen
beteg vizsgálata,
légútbiztosítás

a)
Légzés
:
A kitáguló
és visszasüllyedő mellkas mozgása
jól
látható, amikor a beteg
lemeztenített mellkasát oldalról
annak szintjében
figyeljük. Nem lélegzik a beteg ill.
légzése a szervezet oxigén
ellátását nem
biztosítja, ha fél perc alatt nem
észlelhető légzőmozgás.
Normális 14-16/perc
Keringés

:
Szívösszehúzódkor
a szív kamrái kb.70 ml vért
nyomnak az aortába, ill. a tüdőverőérbe.
A kamrák kitágulásakor az
ütőerek
rugalmas fala összehúzódva
továbbítja a vért, ez a
lűktető, pulzáló mozgás
jól
tapintható az artériákon. Art. carotis
communis.
Másodlagos
tünetek :
bőrszín lehet
sápadt (kivérzés) ill. szederjes
(sokk)
pupillák lehetnek
tágak (keringés leállása
után
60.90 másodperc múlva), szűkek
(morfinmérgezés)

b)
Eszméletlenség

Eszméleten az agy
folyamatos aktív működése
által
fenntartott éber állapotot
értjük. Az eszmélet
fiziológiás és

mérsékelt fokú
felfüggesztése az alvás. Erősebb inger a
természetes alvást azonnal
megszünteti, a betegség miatt bekövetkező
eszméletlenség
állapotából azonban a
beteg nem vagy alig ébreszthető.

Vizsgálata

: a

legbiztosabb reflex a
pillareflex !

.

légzés
és keringés
vizsgálata

.

száj- garat

üreg

megtéktetése, vér,

véralvadék, nyák,

hányadék, ételmaradék ill.

idegen test

eltávolítása

.

mozgatható műfogsor

eltávolítása

.

külsérelmi

nyomok vizsgálata

(koponyasérülés,

gerincsérülés)

.

stabil oldalfekvő helyzet

biztosítása

.

megfigyelés