

### 3. Életjelenségek, eszméletlen beteg

Szerző dezs

Elsősegély tételek

3.a) Az  
életjelenségek vizsgálata  
b)

Eszméletlen  
beteg vizsgálata,  
légútbiztosítás

a)  
Légzés  
:  
A kitáguló  
és visszasüllyedő mellkas mozgása  
jól  
látható, amikor a beteg  
lemeztenített mellkasát oldalról  
annak szintjében  
figyeljük. Nem lélegzik a beteg ill.  
légzése a szervezet oxigén  
ellátását nem  
biztosítja, ha fél perc alatt nem  
észlelhető légzőmozgás.  
Normális 14-16/perc  
Keringés

:  
Szívösszehúzódáskor  
a szív kamrái kb.70 ml vért  
nyomnak az aortába, ill. a tüdőverőérbe.  
A kamrák kitágulásakor az  
ütőerek  
rugalmas fala összehúzódva  
továbbítja a vért, ez a  
lűktető, pulzáló mozgás  
jól  
tapintható az artériákon. Art. carotis  
communis.  
Másodlagos  
tünetek :  
bőrszín lehet  
sápadt (kivérzés) ill. szederjes  
(sokk)  
pupillák lehetnek  
tágak (keringés leállása  
után  
60.90 másodperc múlva), szűkek  
(morfinmérgezés)

b)  
Eszméletlenség

Eszméletlen az agy  
folyamatos aktív működése  
által  
fenntartott éber állapotot  
értjük. Az eszmélet  
fiziológiás és

mérsékelt fokú  
felfüggesztése az alvás. Erősebb inger a  
természetes alvást azonnal  
megszünteti, a betegség miatt bekövetkező  
eszméletlenség  
állapotából azonban a  
beteg nem vagy alig ébreszthető.

Vizsgálata

: a

legbiztosabb reflex a  
pillareflex !

.

légzés  
és keringés  
vizsgálata

.

száj- garat

üreg

megtéktetése, vér,  
véralvadék, nyák,  
hányadék, ételmaradék ill.

idegen test

eltávolítása

.

mozgatható műfogsor

eltávolítása

.

külsérelmi

nyomok vizsgálata

(koponyasérülés,  
gerincsérülés)

.

stabil oldalfekvő helyzet

biztosítása

.

megfigyelés