

2. Mentőhívás, gyógyszermérgezés

Szerző dezs

Elsősegély tételek

2.a)

Mentőhívás, a mentőláda

felszerelése

b)

Gyógyszermérgezés

tünetei, teendők

A mentők

hívószáma 104!!!

Mentő

hívásakor az alábbi adatokat kell

bemondani :

1.

Mi történt ?

.

karambol,

gázolás,

öngyilkosság, klinikai halál,

újraélesztés zajlik stb.

2.

Hol történt ?

.

városban :

kerület,

kereszteződés, házszám amely előtt az

esemény történt

.

lakásban :

kerület, utca,

házszám, lépcsőház

száma, emelet, ajtószám,

lakástulajdonos neve

.

üzemben : üzem

neve, címe,

kapu száma, épület száma

.

országúton :

út száma, km

szelvény

.

autópályán

: útszakasz

iránya, km szelvény

.

számozatlan

úton : két

község amely között a baleset

történt, km szelvény amely

után a számozatlan út

leágazik a számozott útról

.

nehezen

megközelíthető

helyszín : találkozási pont ahol egy

személy várja a mentőt

3.

Mennyi sérült
van és milyen
az állapotuk ?

.

könnyű, súlyos,
életveszélyes, halott

4.

Milyen egyéb
segítségre van
szükség ?

.

műszaki mentés,
rendőrség

Mentőláda
felszerelése :

.

sebfertőtlenítéshez
jód és benzin

.

steril mull lapok és
pólyák,gyorskötöző
pólyák

.

háromszögletű
kendő, biztosítótű

.

gumikesztyű

.

steril vatta, olló,
ragtapesz

.

rugalmas pólya

.

kis füzet
feljegyzésekhez

.

fájdalomcsill.,lázcsill.,görcsoldó

b)

Gyógyszermérgezés
létrejöhét szándékosan
(öngyilkossági kísérlet)
és

véletlenül (túladagolás miatt
ill. gyermek). Leggyakoribb az altatószerek
túladagolása. Ennek tünetei :

.

aluszékonyság,
csak erős ingerekre reagál

.

a beteg dűnnyögve
beszél,
magára hagyva azonnal elalszik

.

nagyobb mennyiségű
gyógyszer esetén mély
eszméletlenség

.

légzése
horkoló, akadozó, szakaszos

.

pulzus szapora, könnyen

elnyomható

.

pupillák

morfinszármazékoknál

beszűkülnek,

barbiturátszármazékoknál

felváltva szűkülnek ill. kitágulnak

.

mély

eszméletlenség esetén

függetlenül az altatószer

jellegétől a

pupillák maximálisan tágak

és fényre nem reagálnak

Elsősegélynyújtás

:

.

hánytatás, de

csak ha a

beteg még nem aluszékony és van

garatreflexe

.

eszméletlen beteget

TILOS hánytatni !!!

.

sikeres

hánytatás esetén orvosi szemet

és keserűsót itatunk a beteggel

.

aluszékonyág,

mély álom, eszméletlenség

esetén stabil oldalfekvés

.

ha a beteg

légzése leáll az

altatószer miatt lélegeztetni kell!!!

)

azonnal

kórházba juttatni!!!